



Nieinwazyjny monitoring środowiska

(ksenomonitoring) z użyciem latających strzykawek



dr hab. Magdalena Larska

Sobieszewo, 18.09.2026



Ksenomonitoring

Bioindykacja obecności patogenów z wykorzystaniem organizmów pośredniczących



1

Środowisko i gospodarze

Patogen krąży w populacji ludzi, zwierząt i/lub w środowisku.



2

Organizmy pośredniczące


Badamy organizmy pobierające materiał od gospodarzy lub ze środowiska.



3

Wykrywanie patogenów


Analiza metodami molekularnymi: PCR / qPCR / RT-PCR.



4

Wnioski i zastosowanie

Wyniki wskazują na krążenie patogenu oraz wspierają ocenę ryzyka i nadzór One Health.



Zastosowania



Małe organizmy – duże informacje

Owad na smyczy – wykorzystanie owadów w badaniach klinicznych

Wykorzystanie krwio pijnych pluskwiaków do pobierania próbek krwi od zwierząt egzotycznych

Andrzej G. Kruszewicz¹, Pierre Grothmann², Agnieszka Czujkowska¹, André Stadler³, Arne Lawrenz³, Günter Schaub⁴

z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie¹ oraz Zoologischer Garten Magdeburg (Niemcy)², Zoologischer Garten Wuppertal (Niemcy)³ i Ruhr Universität Bochum (Niemcy)⁴

Use of kissing bugs for blood sampling of exotic animals

Kruszewicz A.¹, Grothmann P.², Czujkowska A.¹, Stadler A.³, Lawrenz A.³, Schaub G.⁴, Warsaw Zoological Garden¹, Magdeburg Zoological Garden (Germany)², Wuppertal Zoological Garden (Germany)³, Ruhr University Bochum (Germany)⁴

Use of kissing bugs (Reduviidae, Triatominae) is an alternative, safe, secure and very promising method of blood drawing that can be used in various, exotic animal species like terns, bats, giraffes, tapirs and



Ryc. 1. Dwutlenek węgla w wydychanym powietrzu oraz ciepło ręki pobudzają pluskwiaka znajdującego się w pojemniku do żerowania (fot. P.G)



Ryc. 2. Specjalna konstrukcja umożliwiająca na nieniepokojące żyrafę umieszczenie pluskwiaka na jej skórze (fot. P.G).

Wektory – stawonogi krwio pijne wykorzystywane w monitoringu

Wektory biologiczne



Najniebezpieczniejsze
to: *Aedes aegypti* i
Ae. albopictus

- Wirusy :

Chikungunya;

Dengue;

Japońskiego
zapalenia mózgu;

Malaria;

Gorączki doliny Rift;

Zachodniego Nilu;

Gorączki Sindbis;

Żółtej gorączki;

Zika

TBEV,
wirus gorączki
krymsko-kongijskiej,

ASFV;

Babesia spp.,

Theileria spp.,

Rickettsia spp.,

Anaplasma spp.,

Francisella
tularensis,

Coxiella burnetii,

Borrelia spp.

Ponad 50 wirusów,
w tym:

Wirus Oropuche,

Akabane,
Schmallenberg
(SBV),

Wirus niebieskiego
języka (BTV), wirus
afrykańskiego
pomoru koni
(AHSV)

Bąkowate
(Tabanidae),
strzyżaki
(*Lipoptena cervi*,
L. fortisetosa)

Bartonella spp.


Anaplasma
phagocytophilum

Rickettsia spp.

Borrelia
burgdorferi

Wirusy przenoszone przez wektory owadzie

Culicoides spp. zwane kuczmanami



Transboundary and Emerging Diseases

Transboundary and Emerging Diseases

RAPID COMMUNICATION


First report of Schmallenberg Virus Infection in Cattle and Midges in Poland

M. Larska¹, M. P. Polak¹, M. Grochowska², L. Lechowski², J. S. Związek³ and J. F. Żmudziński¹

¹ Department of Virology, National Veterinary Research Institute, Puławy, Poland

² Department of Zoology, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

³ Chief Veterinary Officer, General Veterinary Inspectorate, Warsaw, Poland




Samice *Culicoides obsoletus*: A – dziewicza; B - po posiłku z krwi; C – przed składką jaj; D – pigmentowana.

Te niewielkie (około 1 mm) owady żerują między zachodem a wschodem słońca. Tylko samice pobierają krew w celu złożenia jaj i przechodzą 2-3 cykle rozrodcze w ciągu swojego życia. Gatunki kuczmanów są rozróżniane na podstawie wzoru błonek na skrzydłach.



Monitoring SBV



Wirus Schmallenberg - SBV



RESEARCH COMMENT

Schmallenberg virus: a cyclical problem

Magdalena Larska

WHETHER Schmallenberg virus (SBV) is a serious threat to ruminant breeding in Europe or is just another of the transboundary and emerging pathogens becoming popular recently due to changes in climate, political situations or scientific approaches remains under debate. The virus was first identified from outbreaks of rather mild disease in cattle in Schmallenberg (hence the name) in Germany in 2011.¹ Later, it was determined that the virus is transmitted by blood-feeding midges, just like bluetongue virus, which had emerged in the same region of Europe some four years earlier.

SBV is an equivalent of Akabane virus, which is found in tropical areas of Asia and Australia and, like SBV, causes reproductive failure and affects mostly newborn ruminants.

The spread of SBV in Europe was dramatically fast and seroprevalence reached 100 per cent in many areas by 2012. There are many hypotheses about how the virus managed to overwinter. Although many European countries took action in terms of introducing new regulations that would allow control of this new threat, in the face of such rapid transmission and the risk of high economic losses as a consequence of any ban on trade, most did not enforce any restrictive measures.


Since SBV infections are not notifiable, the impact on ruminant breeding is difficult to establish due to under-reporting, under-detection and (despite the initial commotion surrounding the

WHAT YOU NEED TO KNOW

- After the initial epidemic of 2011/12, Schmallenberg virus (SBV) began circulating again in Europe in 2016/17.
- SBV re-emergence should be expected every three to five years, unless measures to control the infection are taken.
- SBV infections in sheep cause significant lamb mortality and other associated reproductive disorders.

discovery of SBV) relatively low scientific interest. Most likely, one of the key factors responsible for the differing perceptions of the impact of SBV is the importance of sheep farming in different countries. While the infection rate in cattle is high, observed malformations of bovine newborns (and hence losses) resulting from in utero SBV infection are very low.² Conversely, while the incidence of SBV infection in sheep was usually reported to be much lower,³⁻⁵ up to 50 per cent of lambs may be lost due to infection in a flock.^{6,9}

A rapid increase in population immunity against SBV and the introduction of newly developed vaccines caused a gradual decline of the epidemic between 2013 and 2015.^{10,11} During this interval, limited or no SBV circulation was observed;¹¹⁻¹³ however, as discussed previously by De Regge,¹⁴ the re-emergence of SBV was expected as the number of naïve ruminants increased. And so, in some countries in continental Europe, another wave of SBV epidemics was observed in 2016.¹⁵⁻¹⁷



Seroprewalencja / odporność populacyjna

**Obecność wirusa w kuczmanach,
identyfikacja wiremii u dorosłych zwierząt,
wzrost przypadków klinicznych**



The severity of clinical signs of Schmallenberg virus infection varies greatly; however, the highest losses due to newborn mortality are seen in sheep



Pierwszy przypadek BTV-3 w Polsce październik 2024 r.



(a)



(b)



(c)



(d)



Article

First Detection of Bluetongue Virus Type 3 in Poland in 2024—A Case Study in European Bison (*Bison bonasus*)

Magdalena Larska ^{1,*}, Anna Orłowska ¹, Wojciech Łopuszyński ², Łukasz Skurka ¹, Agnieszka Nowakowska ¹, Paweł Trębas ¹, Michał K. Krzysiak ^{2,3}, Jerzy Rola ¹ and Marcin Smreczak ^{1,*}

SPAIN >

'Cow Covid' threatens livestock ranches

Epizootic Hemorrhagic Disease (EHD) has killed hundreds of cattle in Europe after being detected in November 2022




Mapa 1: Focos de EHE en España en años 2022 y 2023





Monitoring kuczmanów *Culicoides* spp. w WPN w 2024 r.





Badania aktywności kuczmanów, potencjalnych żywicieli i potencjalnych wrogów



Stwierdziliśmy:

- obecność nowych potencjalnych gatunków *Culicoides* spp. będących wektorami SBV
- sezon aktywności owadów był wydłużony
- możliwość transowarialnej transmisji SBV u kuczmanów
- liczebność kuczmanów w środowisku naturalnym była wielokrotnie wyższa niż w środowisku bytowania zwierząt gospodarskich
- badania gatunkowości w krwi z odwołka (drogi transmisji)
- identyfikacja patogenów i endosymbiontów owadów – potencjalne modele do redukcji populacji owadów

Veterinary Microbiology 166 (2013) 467–473



Contents lists available at ScienceDirect

Veterinary Microbiology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/vetmic





Detection of the Schmallenberg virus in nulliparous *Culicoides obsoletus/scoticus* complex and *C. punctatus*—The possibility of transovarial virus transmission in the midge population and of a new vector

Magdalena Larska ^{a,*}, Lech Lechowski ^b,
Maria Grochowska ^b, Jan F. Żmudziński ^a




<i>Culicoides</i> spp.	<i>n</i> ^a	% ^b	<i>n</i> ^a	% ^b
<i>C. achrayi</i>	214,303	58.9	64,456	38.5
<i>C. chiopterus</i> ^c	426	<0.1	6	<0.1
<i>C. circumscriptus</i>	121	<0.1	17	<0.1
<i>C. deltus</i>	413	<0.1	51	<0.1
<i>C. dewulfi</i> ^c	2	<0.1	2	<0.1
<i>C. fascipennis</i>	124	<0.1	37	<0.1
<i>C. impunctatus</i>	267	<0.1	0	0
<i>C. newsteadi</i>	50	<0.1	5	<0.1
<i>C. obsoletus/scoticus</i> complex ^c	85,048	23.4	63,239	37.8
<i>C. odibilis</i>	0	<0.1	29	<0.1
<i>C. pallidicornis</i>	9	<0.1	134	0.1
<i>C. pictipennis</i>	5	<0.1	0	0
<i>C. pulicaris</i> ^c	442	<0.1	5	<0.1
<i>C. punctatus</i> ^c	58,262	16.0	39,106	23.4
<i>C. reconditus</i>	3	<0.1	6	<0.1
<i>C. salinarius</i>	31	<0.1	139	0.1
<i>C. sengis</i>	0	0	2	<0.1
<i>C. subfascipennis</i> ^c	0	0	12	<0.1
<i>Culicoides</i> (species not identified)	4,229	1.2	22	<0.1
Total	363,735	100	167,268	100

Analiza aktywności kleszczy żerujących na żubrów



Wykryj wcześniej, śledź i reaguj szybciej – podejście metagenomiczne

- Naturalne biosensory środowiska
- Kontakt z wieloma gospodarzami
- Wykrywanie znanych i nowych patogenów
- Monitoring zmian zasięgu i sezonowości
- Wczesny sygnał przed pojawieniem się ognisk
- One Health: człowiek – zwierzę – środowisko




Ważne: wykrycie materiału genetycznego patogenu w owadzie nie oznacza automatycznie jego kompetencji wektorowej ani aktywnego zakażenia. Wynik powinien być traktowany jako sygnał do dalszej weryfikacji.

Metagenom wirusowy *Culicoides*


Podsumowanie przypisań taksonomicznych Kraken2 po odfiltrowaniu fałgów



Najczęściej wykrywane taksony



Porównanie gatunków *Culicoides*



Top 10 taksonów wirusowych w gatunkach *Culicoides*




Uwaga: rycina przedstawia przypisania taksonomiczne uzyskane metodą Kraken2 po odfiltrowaniu fałgów; obecność odczytów nie oznacza potwierdzenia biologicznego zakażenia.

Metagenom bakteryjny *Culicoides*


Podsumowanie przypisań taksonomicznych Kraken2




Najczęściej wykrywane taksony



Porównanie gatunków *Culicoides*



Top 10 taksonów bakteryjnych w gatunkach *Culicoides*



Uwaga: rycina przedstawia przypisania taksonomiczne uzyskane metodą Kraken2; obecność odczytów nie oznacza potwierdzenia biologicznego zakażenia.

Metagenom pasożytniczych protistów *Culicoides*

Podsumowanie przypisań taksonomicznych Kraken2



Culicoides sp.


14
próbek

3
gatunki


81
wykrytych taksonów
pasożytniczych protistów

27 719
odczytów łącznie


Najczęściej wykrywane taksony



Porównanie gatunków *Culicoides*



Top 10 taksonów pasożytniczych protistów w gatunkach *Culicoides*



Uwaga: rycina przedstawia przypisania taksonomiczne uzyskane metodą Kraken2 dla wybranych pasożytniczych protistów na poziomie gatunku; obecność odczytów nie oznacza potwierdzenia biologicznego zakażenia.



Czy wielkość się liczy?



Tabanidae w Polsce

Wybrane gatunki występujące w Polsce – nazwy polskie i łacińskie



ślepek pospolity
Chrysops caecutiens



ślepek czarnożółty
Chrysops relictus



jusznicza deszczowa
Haematopota pluvialis



bączak zielonooki
Atylotus rusticus



bąk plamisty
Hybomitra bimaculata



mitra Muehlfelda
Hybomitra muehlfeldi



bąk bydlęcy
Tabanus bovinus



bąk szary
Tabanus bromius



bąk pastwiskowy
Tabanus maculicornis



bąk jesienny
Tabanus autumnalis



Kandydackie przypisania gatunków wirusów

Top 15 po wyłączeniu oczywistych bakteriofagów; porównanie wg owada i miejsca pochodzenia

Takson na poziomie gatunku

	Białowieża			Pszczyna		Puszcza Knyszyńska			
	 A1 Haematopota	 A2 Tabanus	 A3 Chrysops	 A4 Haematopota	 A5 Tabanus	 A6 H. scutellata	 A7 H. hispanica	 A8 H. pluvialis	 A9 Haematopota
<i>Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus</i>	20.7k	1.9k	7.2k	44.6k	6.4k	9.2k	6.7k	4.6k	1.4k
<i>Cytomegalovirus humanbeta5</i>	11.5k	205	0	27.6k	0	6.8k	5.1k	3.3k	108
<i>Human immunodeficiency virus 1</i>	7.0k	2.9k	1.9k	8.3k	4.4k	3.7k	2.7k	2.5k	577
<i>Alphainfluenzavirus influenzae</i>	2.4k	466	710	2.6k	2.1k	1.1k	595	775	110
<i>Varnsen partiti-like virus</i>	0	0	10.1k	0	0	0	0	0	0
<i>Simian immunodeficiency virus</i>	2.5k	314	382	3.4k	746	878	527	390	53
<i>Cotesia sesamiae bracovirus</i>	2.2k	258	91	2.0k	676	770	813	517	0
<i>Gammanudivirus cameanadis</i>	0	4.5k	37	0	800	0	0	0	0
<i>Subterranean clover mottle virus</i>	1.5k	0	0	1.3k	0	610	533	326	0
<i>Hepacivirus hominis</i>	705	461	291	786	588	450	419	355	82
<i>African swine fever virus</i>	894	143	178	1.4k	326	424	264	219	0
<i>Rotavirus A</i>	651	251	227	606	928	355	238	241	118
<i>Torque teno midi virus</i>	927	311	172	597	464	395	349	211	75
<i>Bracoviriform facetosae</i>	553	0	0	1.4k	377	654	298	192	0
<i>Ponticelli II virus</i>	1.0k	0	0	933	0	530	431	439	0

log10(sygnal NGS + 1)



Kolor odpowiada skali log10 (sygnal NGS + 1)

Próbka i takson Tabanidae



Uwaga: przypisanie metagenomiczne nie potwierdza obecności aktywnego wirusa; wymagane są walidacja mapowania i PCR/qPCR.

Najczęściej przypisywane gatunki bakterii

Top 15 wg sumarycznego sygnału NGS w próbkach A1–A9

Takson na poziomie gatunku



Białowieża




Pszczyna



Puszcza Knyszyńska

	A1 Haematopota	A2 Tabanus	A3 Chrysops	A4 Haematopota	A5 Tabanus	A6 H. scutellata	A7 H. hispanica	A8 H. pluvialis	A9 Haematopota
<i>Enterobacter hormaechei</i>	28.6k	25.6k	413k	121k	131k	1.9M	5.0M	4.5M	21.2k
<i>Pseudomonas rhodesiae</i>	338	369	2.0k	223	457	2.2M	2.9M	1.6M	72.3k
<i>Serratia marcescens</i>	21.9k	4.7M	106k	35.4k	10.2k	55.8k	294k	112k	17.7k
<i>Morganella morganii</i>	3.8k	3.7k	2.8M	161k	834k	8.5k	3.5k	6.1k	1.5M
<i>Acidovorax temperans</i>	291	281	1.4k	253	1.6k	657k	222k	387k	3.3M
<i>Escherichia coli</i>	208k	148k	1.5M	931k	731k	217k	201k	233k	103k
<i>Aeromonas hydrophila</i>	2.1k	1.3k	10.7k	13.3k	6.7k	3.5k	2.8k	4.1k	3.9M
<i>Hafnia alvei</i>	8.7k	3.0M	635k	15.4k	13.3k	29.7k	14.4k	39.1k	24.2k
<i>Paraclostridium bifermentans</i>	1.4k	450	2.0M	112k	278k	793	583	466	2.3k
<i>Moellerella wisconsensis</i>	578	1.6M	281k	1.3k	3.2k	424	300	581	1.2k
<i>Acinetobacter dispersus</i>	265	90	1.2k	232	138	497k	357k	633k	206
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	22.8k	7.2k	22.7k	34.4k	704k	78.8k	65.6k	58.7k	157k
<i>Acinetobacter lwoffii</i>	1.9k	466	850	2.7k	1.2k	416k	290k	307k	417
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	71.4k	68.5k	129k	99.5k	85.1k	110k	148k	132k	169k
<i>Segatella copri</i>	232k	855	507	621k	1.8k	75.7k	40.5k	25.8k	1.5k

log10
(sygnał NGS + 1)




Próbka i takson Tabanidae

Liczby w komórkach = wartości sygnału NGS; barwa = skala log10.

Najczęściej przypisywane gatunki pasożytów

Top 15 taksonów pasożytniczych Eukaryota wg sumarycznego sygnału NGS



Próbka i takson Tabanidae

Uwaga: są to przypisania taksonomiczne NGS; nie oznaczają automatycznie potwierdzonej inwazji gospodarza.

Dziękuję za uwagę

Nieinwazyjny monitoring środowiska
(ksenomonitoring) z użyciem latających strzykawek

Zdrowe środowisko
- zdrowi ludzie
- zdrowe zwierzęta
(One Health)



Nauka
dla zdrowszej
przyszłości

Pytania?

Przedstawione badania były częścią realizacji m.in. tematu statutowego PIWet-PIB S/645 pt. Ocena przydatności bąkowatych (Tabanidae) do nieinwazyjnego monitoringu zakażeń wirusowych w populacjach zwierząt wolno żyjących – badania wstępne.